

# Behandeling van IAD letsel bij een kind met Flaminal®

LIVE THE LIFE YOU LOVE



Jeannine Spinnael, Verpleegkundig Specialist Wondzorg, UZ  
Brussel, Jette, België



# Behandeling van IAD letsel bij een kind met Flaminal®

LIVE THE LIFE YOU LOVE

*Jeannine Spinnael, Verpleegkundig Specialist Wondzorg, UZ Brussel, Jette, België*

15 Dec 2015



- T: verspreide open letsels, fibrine, erosie
- I: geen tekens van infectie
- M: matig wond exsudaat
- E: roodheid rond de letsels is afkomstig van eosine resten

17 Dec 2015



- T: minder fibrine, granulatieweefsel
- I: geen tekens van infectie
- M: amper wond exsudaat
- E: beginnende epithelialisatie

21 Dec 2015



- T: klein letsel onderaan met beperkte fibrine, duidelijke wondcontractie
- I: geen tekens van infectie
- M: geen wond exsudaat
- E: ver gevorderde epithelialisatie

7 dagen

- Reinigen: met Cavilon™ verzorgingsdoekjes voor incontinentie, niet nadrogen.
- Primair wondverband: Flaminal® Hydro op de letsels afdekken met een geperforeerd siliconen wondcontactlaag.
- Secundair verband: luier om te fixeren.
- Bij ELKE luierwissel deze behandeling herhaald.
- De geperforeerde siliconen wondcontactlaag bij elke luierwissel gereinigd met water en 1x per dag vernieuwd.



- Incontinentieletsel.
- Kind met infant leukemie, opgenomen met koorts t.g.v. neutropenie, onder chemotherapie.