

Behandeling van een arterieel ulcus

 **Margot van Kemmeren, Wondconsulent**
Beweging 3.0 Amersfoort, Nederland

Voorgeschiedenis en behandeling

89-jarige patiënte heeft tijdens het traplopen haar rechter onderbeen opgehaald. De patiënte is bekend met arterieel vaatlijden en kan niet geopereerd worden gezien haar slechte lichamelijke conditie. Patiënte is gehuwd, echtgenoot en buurman zijn mantelzorger.


Wondbeleid:

- 3 x per week reinigen met Prontosan®.
- Flaminal® Forte in de wond (later overstap gemaakt naar Flaminal® Hydro)
- Vetgaas eroverheen
- Afdekken met absorberend verband en een elastomul zwachteltje.
- Hierover werd een pantykousje gedragen.

Dag 1

Overleg huisarts over doorverwijzing vaatchirurg. Mevrouw en familie willen dit niet meer. Start antibiotica.

- T** 80% geel fibrineus beslag, 20% granulatieweefsel (6 cm lang x 4 cm breed)
- I** Infectie
- M** Vochtige wond
- E** Onregelmatig, gedeeltelijk ontveld en gezwollen



Na 1,5 maand

Inmiddels werd gestopt met Prontosan® en Flaminal® Forte. De behandeling werd verdergezet met Flaminal Hydro wegens minder vocht.

Verweking van wondranden omdat het vetgaas dubbel was aangebracht.

- T** 40% geel fibrineus beslag, 60% granulatieweefsel (7 cm lang x 2,3 cm breed)
- I** Geen infectie
- M** Vochtige wond
- E** Gemacereerd



Na 2 maanden

De wond laat een positieve genezingstendens zien en de wondbehandeling met Flaminal® Hydro blijft.

- T** 100% granulatieweefsel (4,2 cm lang x 1,6 cm breed)
- I** Geen infectie
- M** Vochtige wond
- E** Intact



Na 4 maanden

De wond is geheeld en de wondbehandeling werd bijgevolg stopgezet. De huid werd dagelijks verder verzorgd met indifferente crème.



Lees de volledige
casus hier.



TIP:

Hoelang kan Flaminal® op de wond blijven?

- In eerste instantie, check dagelijks de wond.
- Flaminal® kan ter plaatse blijven zolang de gelstructuur intact is (1 tot 4 dagen, afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat).
- Bij lekkage of als er nog onvoldoende Flaminal® aanwezig is, moet Flaminal® (Hydro en Forte) worden vervangen (5mm dik) en moet een nieuw verband worden aangebracht.