

CASE REPORT

Trattamento delle lesioni cutanee del Sarcoma di Kaposi con Flaminal®

Sharon Gardener, Tissue Viability Nurse, Christie NHSFT

Treatment of skin lesions from Kaposi's Sarcoma with Flaminal®



PAZIENTE

- Uomo
- 51 anni




ANAMNESI

- Sarcoma di Kaposi correlato all'AIDS
- Numerosi periodi di ricoveri ospedalieri e antibiotici per via endovenosa
- Aveva sopportato diversi episodi di infezione, tra cui cellulite
- Sviluppo di lesioni cutanee estese su entrambi gli arti inferiori

Trattamento delle lesioni cutanee del Sarcoma di Kaposi con Flaminal®

Giorno 1



FERITA

- Diverse ferite circonferenziali alla parte inferiore delle gambe, ai piedi e alle dita dei piedi.
- Molte aree profonde con tendine esposto.
- Alti livelli di essudato
- Slough e tessuto necrotico molto maleodorante
- Doloroso

Cura

- Medicazione primaria: Flaminal® Hydro sulle aree con essudato inferiore e Flaminal® Forte sulle aree con essudato superiore.
- Medicazione secondaria: superassorbente, fissato con lana ortopedica
- La medicazione veniva cambiata ogni 2 giorni per le prime 2 settimane, poi ridotta ad ogni 3 giorni.
- Il paziente e il suo partner erano in grado di curarsi da soli.
- Il dolore si è ridotto drasticamente ed è migliorato entro 2 mesi, di cui il paziente era molto soddisfatto.



Trattamento delle lesioni cutanee del Sarcoma di Kaposi con Flaminal®

Dopo 2 mesi



Flaminal® Hydro & Flaminal® Forte:

- Adatto a qualsiasi forma e dimensione della ferita
- Per vari tipi di ferite
- Applicazione semplice

