

CASE REPORT

Trattamento di una ferita facciale con Flaminal® in un neonato con epidermolisi bollosa giunzionale di Herlitz (HJEB)

Jackie Denyer, Clinical Nurse specialist EB paediatric, Great Ormond Street Hospital

Trattamento di una ferita facciale con Flaminal® in un neonato con epidermolisi bollosa giunzionale di Herlitz (HJEB)



PAZIENTE

- Male
- 3 years old
- Bright inquisitive child
- Loved to go out with his family



ANAMNESI

- Developed lesions on napkin area, umbilicus, shedding of finger and toe nails shortly after birth
- Age 1 he developed acute respiratory obstruction needing emergency surgery for a permanent tracheostomy
- Developed large wound over the face, which suffered continual trauma from rubbing

Trattamento di una ferita facciale con Flaminal® in un neonato con epidermolisi bollosa giunzionale di Herlitz (HJEB)

Giorno 1



FERITA

- Ferita criticamente colonizzata, coltivata da Staphylococcus Aureus e Pseudomonas
- Incrostata di cibo
- Molto maleodorante
- Pelle tirata sotto gli occhi che ha causato una ridotta produzione di lacrime e dolorose abrasioni corneali

Cura

- Nessuna cura antibiotica
- Medicazione primaria: Flaminal® Forte con Flaminal® Hydro sulle aree di croste
- Applicazione giornaliera
- Dopo 7 giorni è stato aggiunto uno strato sottile di pomata a base di clobetasolo propionato ogni giorno in aggiunta al Flaminal® 12 ore dopo
- Dopo 12 mesi la ferita era completamente guarita e la qualità di vita del paziente era migliorata



Trattamento di una ferita facciale con Flaminal® in un neonato con epidermolisi bollosa giunzionale di Herlitz (HJEB)

Dopo 12 mesi



Flaminal® Hydro & Flaminal® Forte:

- Adatto a qualsiasi forma e dimensione della ferita
- Per vari tipi di ferite
- Applicazione semplice

